

OXOMEMAZINE®

Oxomemazine chlorhydrate 5mg/5ml Solution buvable 100ml

FORME ET PRESENTATION :

Solution buvable. Flacon de 100 ml. 1 c à café = 5ml de solution = 5mg de principe actif.

COMPOSITION :

Oxoméazine (DCI) chlorhydrate 0.111 g
Excipients: Parahydroxybenzoate de méthyle sodé et de propyle sodé, saccharose, arôme de banane eau qsp 100 ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:

Antihistaminique à usage systémique (R : système respiratoire)

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des toux non productives gênantes en particulier allergiques et irritatives.
- Traitement des manifestations allergiques diverses, rhinite spasmodique (périodique ou apériodique), conjonctivite; œdème de Quincke, urticaire.
- Traitement des affections dermatologiques prurigineuses (Eczéma, prurigos, ...)

CONTRE INDICATIONS :

Absolues :

- Hypersensibilité à l'un des constituants notamment aux anti-histaminiques.
- Antécédents d'agranulocytose.
- Risque de rétention urinaire liée à des troubles uréthroprostatiques.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Relatives :

- pendant le premier trimestre de la grossesse et en cas d'allaitement.
- Sultopride : interactions médicamenteuses.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est recommandé de ne pas l'utiliser chez les enfants âgés de moins de 2 an.
- la surveillance (clinique et électrique) doit être renforcée chez les épileptiques, possibilité d'abaissement du seuil épileptogène.
- A utiliser avec prudence; Chez le sujet âgé sensible à l'hypotension orthostatique, aux vertiges, à la sédation, constipation

chronique, hypertrophie prostatique.

Chez les sujets atteints d'affections cardiovasculaires.

En cas d'insuffisance hépatique et / ou rénale sévère.

- la prise de boissons alcoolisées ou médicaments contenant de l'alcool est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.
- Les patients sont avisés sur le risque de somnolence notamment pour les conducteurs et les utilisateurs de machines.

EFFETS INDESIRABLES :

- sédation des muqueuses, constipation, troubles de l'accommodation mydriase, palpitations cardiaques, vertiges, tremblements, confusion mentale, hallucinations.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale; Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 2an.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

La posologie est à répartir en 2 ou 3 prises.

- Adultes et enfants de plus de 40kg (soit 12ans): 2 à 8 cuillères à café de solution buvable.
 - Enfants : en fonction du poids de l'enfant.
 - 2-5 ans=5-10mg soit 2 à 4 cuillères à café par jour.
 - 5-10 ans=20-30mg soit 4 à 6 cuillères à café par jour.
- Les prises sont à renouveler en cas de besoin et doivent être espacées de 4h minimum.
- Il convient de privilégier les prises vespérales en raison d'effet sédatif, surtout au début du traitement avec l'oxoméazine.

SURDOSAGE :

- convulsions (surtout chez l'enfant) troubles de la conscience, coma.
- Traitement symptomatique en milieu spécialisé.

CONSERVATION:

entre 15 ° et 30 ° dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N° d'enregistrement : 97/20 C 055/073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.J TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



أكسوميمازين ©

أكسوميمازين كلورهيدرات 5مغ/5مل محلول للشرب 100مل

• خطر النعاس بالأخص عند سائقي السيارات والعاملين على الآلات.
• ينصح بعدم تناول المشروبات الكحولية أثناء المعالجة.

الشكل والتقديم:

محلول للشرب. قارورة ذات 100 مل.
كل ملعقة قهوة = 5 مل من المحلول = 5 مغ من العنصر الفعال.

التكوين:

أكسوميمازين كلورهيدرات 0.111 غ
سواغ: براهيدروكسي بنزوات مثيل صودي، بروبيل صودي، سكروز،
عطر الموز، ماء، ك ك ل 100مل

التصنيف الصيدلاني العلاجي:

مضاد للهستامين (الجهاز التنفسي (R))

الاستطباب:

• أعراض الحساسية المختلفة.
• التهاب الأنف التحسسي (الموسمي والمتوتر).
• التهاب الملتحمة، وذمة كوينك، الشرى.
• الأمراض الجلدية الحكاكية (الإكزيمة الحكاكية).

مضادات الإستعمال:

• حساسية لأحد المكونات خاصة المضادات الهيستامينية.
• الغلوكوما بإغلاق الزاوية .
• خطر الإحتباس البولي المرتبط بإضطرابات مبالية بروتستاتية.
• مدة الثلاثي الأول للحمل وفي حالة الرضاعة.
• تداخل دوائي مع Sultopride.

إحتيانات الإستعمال:

• لا يعطى للرضع أقل من سنتين
• تشديد المراقبة الإكلينيكية عند الأشخاص الذين يعانون من نوبات
الصرع.
• يستعمل بحذر:

لدى المسنين الذين يعانون من إنخفاض الضغط القوي، الدوخة،
القبض المرزمن، تضخم الغدة البروستاتية و الحساسين للمسكنات
عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض القلبية.
في حالة قصور كبدي و /أو كلوي حاد.

أعراض غير مرغوبة:

• نعاس، جفاف مخاطي، إضطرابات في التكيف، تمدد الحدقة،
خفقان في القلب، إحتباس بولي، قبض.
• إنخفاض ضغط وقوفي، دوخة، إرتعاش، إلتباس فكري، هذيان،
صداع.

مقادير وكيفية الإستعمال:

• عن طريق الفم .
• خاص بالكبار والأطفال الأكبر من سنتين.
• في كل الحالات يجب التقيد بوصفة الطبيب وخاصة عند الرضيع.
• المقدار اليومي المتوسط الموزع على جرعتين أو ثلاث
جرعات هو:

البالغين والأطفال أكثر من 40 كغ (12 عام):

2 إلى 8 ملاعق قهوة من الشراب.

الأطفال: حسب وزن الطفل :

- 2-5 سنوات: 5-10مغ (2 إلى 4 ملاعق قهوة في اليوم).

- 10-5 سنوات: 20-30مغ (4 إلى 6 ملاعق قهوة في اليوم).

تعاد الجرعات عند الحاجة، مع إحترام التباعد بينها (4ساعات) .

جرعة مفردة:

• إختلاج (تشنج وانتفاض) خاصة عند الطفل.

• إضطرابات في الوعي، غيبوبة.

• علاج الأعراض في وسط إستشفائي.

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 01/2017

رقم التسجيل: 97/20 C 055/073

لا يترك الدواء في متناول الأطفال.

مخابر ايزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com