

ميكوليز[®] أطفال

كربوسيستين 2 % ، محلول للشرب 100 مل

الشكل والتقديم:

محلول للشرب، قارورة 100 مل.

5 مل من المحلول = 100 مغ من العنصر الفعال.

تأثيرات جانبية:

يمكن ظهور بعض الأعراض مثل: تزمّت المعدة، غثيان يزول عند تخفيف الجرعات.

التركيب:

كربوسيستين..... 2غ
سواغ: هيدروكسيد الصوديوم، براهيـدروكسي بنزوات المثيل، عطر الكراميل فانيليا ، مادة ملونة (E122)، سكر، ماء ك ك ل 100مل

الخصائص:

كربوسيستين حال للمخاط، يسهل طرده وبالتالي يساعد على إخراج الإفرازات المخاطية، تهوية القصبات الهوائية والشفاء.
الكربوسيستين تساعد كذلك على دخول بعض المضادات الحيوية على مستوى الإفرازات المخاطية التنفسية.

دواعي الاستعمال:

معالجة أمراض المجاري التنفسية المصحوبة بصعوبة إفراز المخاط:
-التهاب القصبات الهوائية، التهاب الرغامي والقصبات.
-التهاب مخاطية الأنف، التهاب الحرقوة، التهاب الأذن المصلي المخاطي.

احتياطات الاستعمال:

-عند مرضى داء السكري، يجب الأخذ بعين الاعتبار كمية السكر 3غ/5 مل.

المقادير وطريقة الاستعمال:

-عن طريق الفم

-ملعقة قهوة = 5 مل = 100 مغ من الكربوسيستين.

المقادير المعتادة هي: 20 إلى 30مغ/كغ/ اليوم أي:

-الطفل من 2 إلى 5 سنوات: 5مل، مرتين في اليوم.

-الطفل الأكبر من 5 سنوات: 5مل، 3 مرات في اليوم.

-في حالة التهاب الأذن المصلي المخاطي نستطيع مضاعفة المقادير.

مدة العلاج:

-في حالة الأمراض الحادة للقنوات الهوائية: من 8 إلى 10 أيام.

-في حالة الأمراض الراجعة لمنطقة الأنف و الأذن و الحنجرة أو القصبات: من 10أيام إلى 3 أسابيع، مع إعادة العلاج عدة مرات في السنة.

يمكن ملاحظة زيادة في التنخم خلال الأيام الأولى للعلاج، وهذا يعني تحسن حركة الإفرازات المرضية. لا يوجد أي خطر لزيادة الإفرازات القصبية عند إتباع المقادير العادية.

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2018/04

رقم التسجيل: 06/20D 041/073

هذا الدواء، لا تتركه في متناول الأطفال